

DESCRIPCIÓN

MASTER INTRAPLAST Es un aditivo en polvo que contiene plastificantes especiales y productos expansores finamente molidos que actúa sobre la mezcla como:

Expansor
Deflocuante

No contiene cloruros.

VENTAJAS

- * Impide la floculación plastificando las partículas de cemento en suspensión acuosa, se logra así una mejor penetración del aglomerante en fisuras o poros
- * Estabiliza las lechadas de cemento, reduciendo la segregación y exudación del agua.
- * Expande el material inyectado antes y durante el fraguado (1% al 3% del volumen) aumentando la adherencia e impermeabilidad.

USOS

- * Concreto de relleno y en general en cualquier tipo de inyección de concreto o mortero.
- * Inyecciones de pastas o morteros en fisuras, grietas, juntas, vainas de cables pretensados.
- * Reparaciones de concreto dañado o mal confeccionado (cangrejeras)

MODO DE EMPLEO

Para cangrejeras y rellenos:

Debe eliminarse piedras sueltas y lechada superficial hasta llegar al concreto sano para asegurar una perfecta adherencia en reparaciones estructurales, debe emplearse MASTER POX 32, puente de adherencia epoxico.

La mezcla para la reparación debe ser hecha con los mismos materiales que se utilizaron para la confección del concreto y de aproximadamente la misma dosificación.

Para Inyecciones:

En inyecciones de grietas o vainas de cables de concreto postensado debe utilizarse una bomba (manual o con motor) para introducir a presión la mezcla de inyección. Esta mezcla puede ser un mortero rico (una parte de cemento por una parte de arena fina) o pasta pura con MASTER INTRAPLAST.

En cada caso hay que determinar previamente el grado de inyectabilidad de la mezcla para asegurar su buena penetración y evitar la exudación o segregación.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo, tiempo de almacenaje en empaque original 1 año.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Polvo
Color: Gris
Densidad: 1,40 Kg/L

PRESENTACIÓN

Bolsa x 15 kg.
1 BC de MASTER INTRAPLAST = 20 Litros de relleno.

DOSIFICACIÓN

Postensado 450 gr. X BC hasta 600 gr. X BC
Expansión 850 gr. X BCos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.